

## วิธีการคียวิธีใช้ยาในระบบ HOSxP PCU

ยารับประทาน โดยทั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่งการ key 4 หลัก

**ตัวอย่าง** HALOPERIDOL 5 MG.TAB      **11pt**



รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เข้า

<b><u>1</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>p</u></b>	<b><u>t</u></b>
หลักที่ 1	หลักที่ 2	หลักที่ 3	หลักที่ 4

**หลักที่ 1** หมายถึง รับประทานครั้งละกี่เม็ด, กี่ซองชา, กี่ซองโตะ และครั้งละกี่ซีซี

**หลักที่ 2** หมายถึง จำนวนครั้งที่ให้ยาต่อ 1 วัน

**หลักที่ 3** หมายถึง เวลาไหน

a : ก่อนอาหาร

p : หลังอาหาร

**หลักที่ 4** หมายถึง ชนิดของยา

t : ยาเม็ด

s : ยาน้ำซองชา

j : ยาน้ำซองโตะ

Z : ซีซี (CC)

### วิธีใช้ที่เป็นข้อแตกต่างไป

11ht : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน

21hs : รับประทานครั้งละ 2 ซ้อนชา, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน

qtroche : อมครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชม. เวลามีอาการเจ็บคอ

1.5 prs pcm : รับประทานครั้งละ 1 ซ้อนชาครึ่ง ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้

.51pt : รับประทานครั้งละครึ่งเม็ด, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เช้า

21 ad pt : รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันเว้นวัน หลังอาหารเช้า

drp : จิบเวลาไอ

ยาหยอดตา ประกอบด้วย : ชนิดของยา (ตา = ed), ข้างที่เป็น (r = ขวา; l = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่  
ที่ใช้

edr1 : หยอดตาขวา ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 1 ครั้ง เช้า

edb4 : หยอดตาทั้ง 2 ข้าง ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เช้า – กลางวัน – เย็น - ก่อนนอน

edl1hs : หยอดตาซ้าย ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

edeq4 : หยอดตาข้างที่เป็น ครั้งละ 1 - 2 หยด ทุก 4 ชั่วโมง

ยาหยอดหู ประกอบด้วย : ชนิดของยา (หู = ea), ข้างที่เป็น (r = ขวา; l = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่  
ที่ใช้

ear2 : หยอดหูขวา ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

eal3 : หยอดหูซ้าย ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น

ea4 : หยอดหูข้างที่เป็น ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เช้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน

### ยาป้ายตา

ep14 : ป้ายตาซ้าย วันละ 4 ครั้ง เช้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน

ep3 : ป้ายตาข้างที่เป็น วันละ 3 ครั้ง เช้า – กลางวัน – เย็น

### ยาทา

ap2 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

ap3 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น

apm4 : ป้ายแผลในปาก วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น – ก่อนนอน

### ยาสูดพ่น

mdi2x2 : พ่นยา 2 ที วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

mdi1puffq4 : พ่นยา 1 ที โดยกดกันขวดยาลงจนสุด 1 ครั้ง พร้อมสูดยาทุก 4 ชั่วโมงเวลามีอาการ

### ยาพ่นจมูก

ns12 : พ่นจมูก 1 ข้าง วันละ 2 เวลา เช้า - เย็น

ns21 : พ่นจมูก 2 ข้าง ข้างละ 1 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง เช้า

ns22 : พ่นจมูก 2 ข้าง ข้างละ 2 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

### ยาเหน็บทวาร

rect sp h : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

rectal 12 mh : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า – ก่อนนอน

### ยาเหน็บช่องคลอด

11 vgspl : สอดช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

21 vgspl : สอดช่องคลอด ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

## ยาฉีด

im นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

iv นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

sc นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง